



Comune di Melano



AVVISO

Trattamenti della vite contro la cicalina vettore della flavescenza dorata nei vigneti

Gentili Signore, Egregi Signori,

Vista la presenza nella nostra regione della malattia della vite chiamata flavescenza dorata (organismo nocivo particolarmente pericoloso), la Confederazione, per il tramite dell'Ufficio federale dell'agricoltura, ha definito una zona infestata nella quale vige l'obbligo di impedire che la cicalina vettore della flavescenza dorata si diffonda ulteriormente.

Considerato che quasi tutto il Cantone Ticino rientra nella zona infestata occorre mettere in atto le misure di contenimento.

Durante la stagione vegetativa è obbligatorio eseguire su tutte le superfici vitate e le piante di vite due trattamenti fitosanitari con prodotti a base di piretrine naturali (ammesse anche in agricoltura biologica).

Sul retro di questo foglio trovate i prodotti omologati da utilizzare e come effettuare i trattamenti fitosanitari.

Per poter garantire una lotta contro la cicalina insetto che diffonde in modo efficace la malattia **tutti i possessori di viti devono obbligatoriamente eseguire gli appositi trattamenti, compresi i proprietari di viti singole e pergole.**

Il Municipio mette a disposizione i suoi servizi per il trattamento diretto a chi possiede un numero limitato di ceppi (massimo 10) ed a chi non ha un'attrezzatura propria e, in entrambi i casi, non ha occasione di collaborare con altri viticoltori già organizzati, il costo per ogni intervento da parte degli operai comunali ammonterà a fr. 10.—.

Il Servizio fitosanitario cantonale indicherà i tempi per i due trattamenti previsti.

Ricordiamo che il trattamento è obbligatorio ed invitiamo coloro che rispettano le condizioni di cui sopra e che non hanno la possibilità di collaborare con altri viticoltori già organizzati, a volersi

annunciare presso la Cancelleria comunale: entro il 31 maggio 2021.

Il personale della Cancelleria comunale è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (il documento redatto dalla Sezione agricoltura può essere richiesto alla Cancelleria comunale).

Vi ringraziamo per la collaborazione e cogliamo l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

IL MUNICIPIO

Melano, maggio 2021

Prodotti omologati

Nome commerciale prodotto	Ditta	Confezioni disponibili	Amnesso in BIO	Dose	
Parexan N*	Omya	1 L, 0.5 L, 100 ml	Si	0.1%	0.16 ml/m ²
Piretro MAAG*	Syngenta	0.5 L	Si	0.1%	0.16 ml/m ²
Pyrethrum FS*	Andermatt	5 L, 0.5 L, 100 ml	Si	0.05%	0.08 ml/m ²

* Restrizioni e osservazioni

Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api.

Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva e del dilavamento:

- ❖ **rispettare una zona tampone non trattata di 50 metri dalle acque superficiali** (deriva);
- ❖ rispettare una zona tampone con copertura vegetale di almeno 6 metri (dilavamento);
- ❖ la distanza per evitare gli effetti della deriva può essere ridotta seguendo le *"Istruzioni concernenti misure per la riduzione dei rischi nell'utilizzo di prodotti fitosanitari"* (pubblicazione UFAG) alle quali si rimanda per maggiori dettagli. Si configurano due casi:
 - applicazione con atomizzatore: in questo caso, in vigneti con filari paralleli al corso d'acqua, si può ridurre la fascia tampone a 20 m. In pratica non si deve intervenire nella fascia tampone di 20 m e si trattano le prime cinque file solo verso l'interno della parcella. A partire dalla sesta fila si può trattare sui due lati. Anche l'interposizione di idonee barriere artificiali o vegetali tra il vigneto e il corso d'acqua può permettere una riduzione della fascia tampone (consultare le istruzioni UFAG);
 - applicazione con altri mezzi: in questo caso bisogna calcolare il numero di punti che è possibile ottenere secondo le istruzioni UFAG. Con due punti è possibile ridurre la fascia tampone a 6 m. Con tre punti, solo per i viticoltori non iscritti ai pagamenti diretti, è possibile ridurre la fascia tampone a 3 m.
- ❖ per maggiori informazioni sulle fasce tampone rimandiamo alla pubblicazione Agridea *"Fasce tampone. Come misurarle, come gestirle?"*

Esecuzione dei trattamenti

Il periodo per effettuare i trattamenti verrà comunicato dal Servizio fitosanitario cantonale.

La corretta esecuzione dei trattamenti è fondamentale per garantire un'efficacia adeguata e permettere il contenimento dell'insetto vettore e della malattia.

Esecuzione del trattamento

- Utilizzare un prodotto nuovo o acquistato recentemente, conservato ben chiuso, al riparo dalla luce, da elevate temperature e da temperature inferiori a 10°C.
- Utilizzare la miscela di trattamento subito dopo la sua preparazione.
- Applicare il prodotto con bassa intensità luminosa e basse temperature (sera o mattina presto).
- Trattare tutta la parete fogliare e i polloni eventualmente presenti sul tronco.
- Trattare anche piccoli vigneti e singole piante di vite.
- È possibile eseguire il trattamento in combinazione con i fungicidi. Verificare sempre la miscibilità dei prodotti e in caso di dubbi chiedere ai distributori.
- Rispettare scrupolosamente le indicazioni di utilizzo.

Gestione del vigneto

- Eseguire cimature, sfemminellatura e palizzata dei germogli per evitare eccessi di vegetazione (al più tardi due giorni prima del trattamento).
- Non spollonare subito prima e subito dopo il trattamento. Indicativamente effettuare una spollonatura entro la prima settimana di giugno.
- Sfalciare l'interfilare se sono presenti erbe in fiore o se l'inerbimento è d'ostacolo alla corretta distribuzione del prodotto (al più tardi due giorni prima del trattamento).